

Este sitio web está archivado para fines históricos y no tendrá mantenimiento o actualizaciones.

EL ZIKA Y LA TRANSMISIÓN SEXUAL



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA Y EL SEXO



Cómo se propaga el zika por vía sexual

- Una persona con zika puede transmitir el virus por vía sexual a sus parejas sexuales. Vía sexual implica sexo vaginal, anal y oral, y compartir juguetes sexuales.
- El zika se puede transmitir a través del sexo, aun si la persona infectada no tiene síntomas en ese momento. Una persona con zika puede contagiar antes de que comiencen sus síntomas, cuando ya tiene síntomas y una vez que los síntomas desaparecen, y también lo puede transmitir aunque nunca desarrolle síntomas.
- El zika puede permanecer en el semen durante más tiempo que en otros líquidos corporales, incluidos el flujo vaginal, la orina y la sangre.



Se están realizando estudios en este momento para averiguar

- Cuánto tiempo permanece el zika en el semen y flujo vaginal de personas infectadas.
- Durante cuánto tiempo se puede transmitir el zika a parejas sexuales.
- Si el zika que contrae una mujer embarazada durante el contacto sexual tiene un nivel de riesgo diferente de defectos de nacimiento al del virus transmitido a través de una picadura de mosquito.



¿Está embarazada?

Lo que debe saber acerca del zika y las relaciones sexuales.

Una persona con zika puede transmitirlo por vía sexual a sus parejas sexuales.



Si su pareja vive en un área con riesgo de zika o viajó a una de ellas, proteja su embarazo.

Use condón cada vez que tenga relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral durante el embarazo.



No tenga relaciones sexuales con su pareja durante el embarazo.

Si piensa que su pareja puede tener o haber tenido zika, informe a su médico o proveedor de atención médica acerca de

- Su historial de viajes
- Si tomó medidas para evitar las picaduras de mosquitos
- Cuánto tiempo permaneció uno de los integrantes en un área con riesgo de zika
- Si tuvo sexo con usted sin protección



¿Su pareja está embarazada?

Una persona infectada con zika puede transmitir el virus a sus parejas sexuales. Como el zika puede causar ciertos defectos de nacimiento, tome medidas para evitar que su pareja se infecte durante el embarazo.



Si vive en un área con riesgo de zika o viaja a una de ellas, proteja el embarazo de su pareja.

Use condón cada vez que tenga relaciones sexuales por vía vaginal, anal u oral durante el embarazo.



Evite tener relaciones sexuales con su pareja mientras esté embarazada.



Si cree que puede tener o que tuvo zika, infórmele a su médico o proveedor de atención médica lo siguiente:

- Su historial de viajes
- Si tomó medidas para evitar las picaduras de mosquitos
- Cuánto tiempo permaneció en un área con riesgo de zika
- Si tuvo sexo con usted sin protección

