

# Кому необходимо сделать прививку от гриппа?

Нехватка  
вакцины  
в 2004 г.



## **Людям, достигшим 65-летнего возраста —**

Даже если у вас отличное здоровье!

## **Детям от 6 до 23 месяцев —**

Именно дети младше 2 лет чаще всего попадают в больницы с диагнозом гриппа.

## **Взрослым и детям с хроническими заболеваниями —**

Таковыми как порок сердца, диабет, заболевание почек, астма, рак или ВИЧ/СПИД.

## **Женщинам, которые забеременеют в инфекционный период —**

Инфекционный период гриппа обычно длится с ноября по март.

## **Людям, проживающим в домах престарелых и инвалидов и в учреждениях длительного ухода.**

## **Детям от 6 месяцев до 18 лет, проходящим постоянное лечение аспирином.**

## **Работникам сферы здравоохранения, участвующим в осуществлении непосредственного ухода за пациентами.**

## **Врачам, работающим по вызову, и членам семей детей младше шести месяцев.**

Если вы не принадлежите ни к одной из этих групп, мы просим вас не вакцинироваться, чтобы оставить вакцину тем, кто подвержен большему риску.

Department of Health  
and Human Services  
Centers for Disease Control  
and Prevention



Для получения дополнительной информации обратитесь к лицу, предоставляющему вам медицинские услуги, или позвоните по горячей линии иммунизации центров CDC:

английский и испанский языки **800-CDC-INFO** Веб-сайт **[www.cdc.gov/flu](http://www.cdc.gov/flu)**