



Những Khuyến Nghị Tạm Thời Về Chủng Ngừa Bệnh Cúm — Mùa Cúm 2004–05

Ngày 5 tháng 10, 2004, CDC được thông báo bởi Công ty Chiron rằng không có liều thuốc nào trong số thuốc chủng bệnh cúm (Fluvirin[®]) của họ sẽ được phân phối ở Hoa Kỳ trong mùa cúm 2004–05. Công ty này cho biết là Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Sản phẩm Y tế / Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) ở Anh quốc, nơi mà thuốc chủng Fluvirin của Chiron được chế tạo, đã tạm thu hồi trong vòng 3 tháng giấy phép sản xuất thuốc chủng Fluvirin của cơ sở tại Liverpool của công ty này, khiến cho công ty không thể cung cấp loại thuốc chủng này cho mùa cúm năm nay. Điều này sẽ giảm thiểu chừng một nửa số lượng thuốc chủng loại chích trivalent inactivated (flu shot) dự kiến được cung cấp ở Hoa Kỳ trong mùa cúm 2004–05.

Số lượng cung ứng còn lại của thuốc chủng bệnh cúm dự kiến sẽ được cung cấp tại Hoa Kỳ trong mùa cúm này là gần 54 triệu liều thuốc chủng có nhãn hiệu Fluzone[®] (inactivated flu shot) do công ty Aventis Pasteur, Inc. chế tạo. Trong số thuốc đó, khoảng 30 triệu liều đã được công ty bào chế thuốc chủng này phân phối cho các nơi. Ngoài ra, khoảng 1,1 triệu liều thuốc chủng loại xịt vào mũi (LAIV/FluMist[®]) do công ty MedImmune chế tạo sẽ được cung cấp trong mùa cúm này.

Vì tình huống khẩn cấp này, CDC, hoạt động phối hợp với Ủy ban Tư vấn Phương pháp Chủng ngừa / Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP), đang đưa ra những khuyến nghị tạm thời cho việc chủng ngừa bệnh cúm trong mùa cúm 2004–05. Những khuyến nghị tạm thời này đã được ACIP chính thức đưa ra vào ngày 5 tháng 10, 2004, và thay thế cho những khuyến nghị trước đó.

Những Nhóm Ưu Tiên Chủng Ngừa Bệnh Cúm

Những nhóm ưu tiên chủng ngừa trong mùa này bằng thuốc chủng khử hoạt (inactivated) sau đây được xem là có ưu tiên ngang nhau và gồm có:

- tất cả các em bé từ 6 tháng đến 23 tháng tuổi;
- những người cao niên tuổi từ 65 trở lên;
- những người trong lứa tuổi từ 2 đến 64 có những chứng bệnh mạn tính thuộc loại dễ trở thành trầm trọng nếu mắc bệnh cúm;
- tất cả những phụ nữ sẽ mang thai trong mùa cúm;
- những người ở các viện dưỡng lão hoặc những cơ sở chăm sóc y tế dài hạn;
- những người từ 6 tháng tuổi đến 18 tuổi được trị liệu kinh niên bằng thuốc aspirin;
- những nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh; và
- những người đến chỗ khác để chăm sóc cho người già hoặc người bệnh và những người ở chung nhà với trẻ em nhỏ hơn 6 tháng tuổi.

Những Khuyến Nghị Khác Về Chủng Ngừa

- Những người thuộc các nhóm ưu tiên nêu trên nên được khuyến khích tìm thuốc chủng ở địa phương nơi họ cư ngụ nếu bác sĩ hoặc bệnh viện nơi mà họ vẫn thường khám bệnh không có thuốc chủng.
- Loại thuốc chủng xịt vào mũi, có vi rút còn sống và được làm yếu đi, nếu có, nên được khuyến khích dùng cho những người khỏe mạnh trong lứa tuổi từ 5 đến 49 và không ở trong thời kỳ mang thai, kể cả những nhân viên y tế (ngoại trừ những người chăm sóc cho các bệnh nhân bị suy yếu nặng hệ thống miễn dịch ở các phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện) và những người chăm sóc cho trẻ em trên 6 tháng tuổi.

Những Khuyến Nghị Tạm Thời Về Chủng Ngừa Bệnh Cúm — Mùa Cúm 2004–05

(tiếp theo trang trước)

- Một số trẻ em dưới 9 tuổi cần đến 2 liều thuốc chủng nếu trước đó các em chưa từng chủng ngừa bệnh cúm. Tất cả những trẻ em thuộc loại có nguy cơ cao bị biến chứng nặng vì cúm, kể cả các em từ 6 đến 23 tháng tuổi, khi đến nơi để chủng ngừa, nên được chủng ngừa bằng liều thứ nhất hoặc liều thứ nhì, tùy vào tình trạng chủng ngừa của em đó. Tuy nhiên, các liều thuốc không nên được dự trữ để bảo đảm là có hai liều thuốc. Thay vào đó, thuốc chủng có sẵn nên được dùng cho những người thuộc các nhóm ưu tiên dựa trên nguyên tắc là ai tới trước thì được chủng trước.

Chủng Ngừa Cho Những Người Không Thuộc Các Nhóm Ưu Tiên

Nên thông báo cho những người không thuộc các nhóm ưu tiên kể trên về tình huống khẩn cấp trong nguồn cung ứng thuốc chủng và yêu cầu họ hủy bỏ hoặc hoãn lại việc chủng ngừa.

Những Người Không Nên Chủng Ngừa Bệnh Cúm

Những người thuộc các nhóm sau đây không nên chủng ngừa bệnh cúm trước khi thảo luận về vấn đề này với bác sĩ của mình:

- Những người bị dị ứng nặng (chẳng hạn như bị dị ứng phản vệ / anaphylactic allergic reaction) đối với trứng gà và
- Những người trước đó đã ngã bệnh vì hội chứng Guillain-Barré trong vòng 6 tuần lễ sau khi chủng ngừa bệnh cúm..

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị truy cập địa chỉ www.cdc.gov/flu, hoặc gọi điện thoại Giây nóng Chủng ngừa Quốc gia ở số (800) 232-2522 (tiếng Anh), (800) 232-0233 (tiếng Tây ban nha), hoặc (800) 243-7889 (dành cho người khiếm thính).