





















Inmunizaciones para Bebés

Una guía para los padres

¡Éstos son las vacunas que necesitan sus bebés!

Al nacimiento	 Hep-B
1-2 meses	 Hep-B 1-4 meses ¹
2 meses	 DTaP  Hib  Polio  PCV7
4 meses	 DTaP  Hib  Polio  PCV7
6 meses	 DTaP  Hib ²  Polio 6-18 meses ¹  PCV7  Hep-B 6-18 meses ¹
12 meses	 MMR 12-15 meses ¹  Hib 12-15 meses ¹  Varicela 12-18 meses ¹  PCV7 12-15 meses ¹
15 meses	 DTaP 12-18 meses ^{1,3}

Verifique con su clínica para asegurarse que su bebé esta siendo vacunado(a) a tiempo. Y asegurese pedir a su clínica para que le den una carta de registro de vacunas con todas las fechas de su bebé.

- Hep-B:** protección contra hepatitis B, una enfermedad seria del hígado
DTaP: protección contra difteria, tétanos, y pertussis (tos ferina)
Hib: protección contra *Haemophilus influenzae* tipo b—causa meningitis
Polio: vacuna inactivo (IPV) (inyectado) protège contra el polio
PCV7: protección contra *Streptococcus pneumoniae*—causa meningitis y neumonía
MMR: protección contra sarampión, paperas, y rubéola (sarampión alemán)
Varicela: vacuna varicela zoster—protección contra varicela

1. Éste es el rango de edad en que se debe dar ésta vacuna.
2. Dependiendo en la marca del la vacuna Hib usado para la primera y segunda dosis, una dosis a los 6 meses de edad quizá no sea necesario.
3. Puede darse lo más temprano como a los 12 meses si 6 meses han transcurrido desde el dosis previo y si el bebe no regrese en 18 meses de edad.