

ԻՆՉ ՊԵՏՔ Ե ԻՄԱՆԱՔ?

2004-2005

1 Ինչու պետք է պատվաստել?

Ինֆլուենզան (Ֆլու) լուրջ հիվանդություն է: Նրա վիրուսը տարածում է հիվանդի քթի և կոկորդի բորբոքած ճամբով: Ինֆլուենզան կարող է պատճառել...

- ջերմություն • կոկորդի ցաւ • դող
• հազ • գլխացաւ • մկանային ցաւեր

Ամեն անհատ ենթակայ է վարակելու Ինֆլուենզայով, որոշ մարդկանց մօտ տևում է այն միայն մի քանի օր, բայց ոմանց մօտ շատ լուրջ և հաւանաբար ենթարկելու հիվանդանոցային խնամքի: Ինֆլուենզան ունի տարեկան հազարավոր մահկանացուներ, գլխաւորապէս տարեցների շրջանում:

Ինֆլուենզայի պատվաստը կարող է կանխել Ինֆլուենզան:

2 Ինֆլուենզայի պատվաստը

Ներկայում երկու տեսակ ֆլուի պատվաստ ուժի մէջ են: Ոչ ակտիվացած (սպանած) ֆլուի պատվաստ, որը սրկուում է, այն գործադրել է ՄիացեալՆահանգներում տարիներ շարունակ: Ակտուալ, տկարացած պատվաստը արտոնագրուել է 2003-ին: Այն գործածուում է որպէս ջրափոշի քթածակերի մէջ:

Ինֆլուենզայի վիրուսը յաճախ ենթարկուում է փոփոխութեան, այդ պատճառով էլ այն օրւայ ձևակերպուում է ստանուում ամեն տարի:

Պաշտպանութեան աճոււմը տևում է 2 շաբաթ պատվաստը ստանալուց յետոյ և ազդեցութիւնը համարեայ մէկ տարի:

Որոշ մարդիկ որ ստանուում են ֆլուի պատվաստը հաւանաբար վարակած դեպքում շատ աւելի թեթևակի պիտի անցկացնեն այդ շրջանը քան նրանք ովքեր բոլորովին չեն ստացել պատվաստը:

Ֆլուի պատվաստը կարող է տուել այլ պատվաստների հետ միաժամանակ ինչպէս և Նմօնեայի պատվաստի հետ:

Որոշ ոչ ակտիվացած ֆլուի պատվաստ պարունակուում է Թայմըրոսալ, սնդիկի որոշ տեսակ, որպէս նախապաշտպանութիւն, և որոշները միայն մի չնչին չափ Թայմըրոսալ: Ոչ մի գիտական փաստ չկայ որ եղած Թայմըրոսալը պատվաստի մէջ վնասակարէ, իմանալ Թայմարոսալի գերակշռութեան և ռիսկի հնարաւորութիւնների մասին ձեր օգտին է: Եթէ ունեք որևէ հարց այս խնդրում, հարցրեք ձեր բժիշկին:

3 Ովքեր պետք է ստանան Ինֆլուենզայի պատվաստը?

Անձից 6 ամսականից վեր և տարեցներ որոնք ունեն առողջութեան աւելի լուրջ և բարդ կացութիւն, և նրանք ովքեր որ մօտ կապակցութեան մէջ են նրանց հետ (Գումարած ընտանիքի անդամները) պետք է ստանան սոյն պատվաստը:

Ինֆլուենզայի պատվաստը հանձնարարուում է հետևեալ խմբերին:

- Բոլոր երեխաներին 6-23 ամսական
• Ընտանիքի անդամներ որոնք դրսում գբաղւած են 6 ամսականից ցածր և անչափահաս մանուկների խնամակալութեամբ:
• Բոլոր 50 տարեկան և վեր անձերը:
• Բլոր նրանք որ ապրում են երկարատև հսկողութեան կենդրոններում, ունենալով ծանր ու հարատև հիվանդութիւններ:
• Հետևեալ առողջական վիճակներից տառապողները:
-Սրտի հիվանդութիւն -Երիկամուկցի հիվանդութիւն
-Թոքերի հիվանդութիւն -Շաքարախտ
-Ազմա -Անեմեա,կամ օտար արեան բարդութիւններ:
• Նրանք ովքեր ունեն թոյլ վարակամեթ վիճակ:
- HIV/AIDS կամ այլ հիվանդութիւն որը ազդուում է վարակամեթ դրութեան վրայ:
- Երկարատև բուժումներ ազդեցիկ դեղամիջոցներով ինչպիսին են ստերոիդները:
- Զաղցկեղ ունեցող անձից որոնք բուժուում են R-ճառագայթներով կամ դեղամիջոցներով:
• 6 ամսական մինչև 18 տարեկան անձից որոնք տևական Ասփիրին կառնեն (եթէ Ինֆլուենզայով վարակւեն կարող են ստանալ Reye Syndrome):
• Տիկնայք որ յղութեան շրջանում են լինելու ֆլուի ժամանակաշրջանում:
• Բժիշկներ, բոյժբոյրեր, ընտանիքի անդամներ, կամ նրանք ովքեր շփման մէջ են այն հիվանդների հետ որոնք պետք ունեն պատվաստման:
• Անհատ որ ցանկանուում է նվազացնել Ինֆլուենզայի վարակելու առիթը:
Ֆլուի պատվաստը խրախուսելի է նաև նրանց:
• Որոնք յատուկ խնամք են մատակարարարում շրջանային կենդրոններում:

- Ովքեր ճամբորդություն ունեն հարավային կիսագունդ Ասիայի և Մեյսոպոտամիայի ընթացքին, կամ էլ արևադարձային գոտիներ և կամ որոշ-լած թուրիստային խմբերի հետ որևէ ժամանակ:
- Ովքեր ապրում են խմբային կենդանակյակ օտար խնամքի տակ կանխելու հիվանդությունների ընդվզումները :

4 Երբ պետք է ստանամ հնֆլուենզայի պատվաստը?

Ամենից լավ ժամանակաշրջանը Ֆլույի պատվաստը ստանալու համար Հոկտեմբեր կամ Նոյեմբեր ամիսներն են:

- Որոշ անձիք պետք է սկսեն իրենց պատվաստումը Հոկտեմբեր ամսին կամ առաջի շուտ: Գումարած ներառեալ մարդիք:
 - Բոլոր 50 տարեկան և վեր անձերը:**
 - Երիտասարդներ, որոնք ենթակա են Ֆլույի և նրա բարդությունների վտանգին (գումարած 6-ից մինչև 23 ամսական երեխաներ)
 - Շնչառության անոթային** որոնք մտոցի աշխատում են նման խմբերի հետ
 - Առողջապահական գործունեաներ**
 - 9 տարեկանից ցածր երեխաներ** որ ստանում են Ֆլույի պատվաստը առաջին անգամ

հնֆլուենզան հաճախակի է իր բարձրագույն աստիճանին հասնել Յունուար-Մարտ ամիսների ընթացքին, բայց առհասարակ իր բարձրագույն աստիճանին է հասնում Փետրուար ամսին: Պատվաստել Դեկտեմբեր ամսին կամ միջին էլ ուշ, առաջի շահաւետ է ամբողջ տարւայ համար:

Մեծամասնությունը կարիք ունեն միայն մէկ պատվաստի ամեն տարի, որպէսզի կանխեն հնֆլուենզան: **9 տարեկա-կից ցածր երեխաներ որոնք առաջին անգամ են ստանում Ֆլույի պատվաստը** կարիք ունեն 2 սրսկումի: Երկրորդ պատվաստը պետք է ստանան մէկ ամիս տարբերութեամբ: Այն երեխաները որոնք ստացել են սոյն պատվաստը անցեալ տարւայ ընթացքին թեկուզ լինելով առաջին անգամ այս տարի կարիքն ունեն միայն մէկ պատվաստի:

5 Որոշ անձիք նախքան պատվաստ ստանալն պետք է կապւեն և խօսել որևէ բժիշկի հետ

Խօսեք բժիշկի հետ նախքան Ֆլույի պատվաստ ստանալն:

- 1) Երբևիցէ ալերգիա ունեցել եք հակիրթի և կամ նախկին Ֆլույի պատվաստը ստանալու ժամանակ, կամ
- 2) Որևէ բժշկական խնդիր ունեք կամ ունեցել եք **Guillain-Barre` (GBS)** անցեալում:

Եթէ տաքություն ունեք կամ լուրջ հիվանդ եք պատվաստի պայմանաւորւած օրում, ընդհանրապէս պետք է սպասեք մինչև ապաքինում, նախքան հնֆլուենզա պատվաստ ընդունելը: Խօսեք ձեր բժիշկի կամ բոլժբոյրի հետ նոր ժամկետ նշանակել պատվաստը ստանալու համար:

6 Որոնք են հնֆլուենզա պատվաստի վտանգները?

Որևէ պատվաստ, ինչպէս այլ դեղամիջոց, ունակ է պատճառելու լուրջ բարդություններ, ինչպիսիք են լուրջ գերզգայնական հակազդեցություններ: Ինֆլուենզայի լուրջ վնաս կամ մահ պատճառելու վտանգը չափազանց փոքր են:

Ոչ ակտիվացած Ֆլույի պատվաստը չունի որևէ լուրջ խնդիրներ: Վիրուսները պատվաստի մէջ սպանւած են, ուրեմն պատվաստ ստանալը պատճառ չէ հնֆլուենզայով հիվանդանալու:

Թեթև բարդություններ:

- Ցաւ, կարմրութիւն և ուռուցք սրսկման վայրում:
- Տաքութիւն
- Ցաւեր

Եթէ այս բարդությունները պատահեն, ապա նրանք սկսում են պատվաստման առաջին օրից և կարող է տևել 1-2 օրեր:

Սուր բարդություններ:

- Լուրջ գերզգայնական հակազդեցություն շատ հազ-վադէպ: Իսկ եթէ առաջանան, այն կը տևի մի քանի րոպէ մինչև մի քանի ժամ տևողութեան ընթացքում:
- 1976 թին,Սուվայն Ֆլու պատվաստից յաղորդութիւն-ներ կան Guillain-Barre` Syndrome (GBS) հիվանդու-թեան մասին, նրանից յետոյ հնֆլուենզա պատվաստը մինչ այս ոչ մի կապակցութեան օղակ չի ունեցել(GBS) ի հետ: Այնուամենայնիվ, եթէ կայ վտանգ հնֆլուենզա պատվաստից ստանալ GBS ը (իւրաքանչիւր մէկ միլիոն դեղաչափից 1 կամ 2 դէպք) առաջի քիչ քան հնֆլուենզայի վտանգը, որը կարելի է կանխել այն պատվաստումով:

7 Ինչ անել մեղմ կամ սուր հակազդեցութեան դէպքերում?

Ինչին պետք է ուշադրութիւն դարձնեմ?

- Որևէ արտասովոր վիճակ,ինչպիսիք են լուրջ գերզգայ-նական հակազդեցութիւն, բարձր տաքութիւն կամ անսովոր վարվելակերպ, լուրջ գերզգայնական հակազդեցութեան նշաններից են շնչելու դժարութիւն, խռպոտ ձայն կամ հծծում, մաշկի այրոց, գունատու-թիւն, թոյլութիւն, սրտի արագ տրոփում, կամ գլխապտոյտ:

Ինչ պետք է անեմ?

- **Հեռաձայնեցեք** բժիշկին, կամ հիվանդին շուտափոյթ կերպով հասացրեք բժիշկի:
- **Յայտնեցեք** ձեր բժիշկին եղելութեան մասին թականն ու ժամանակը և երբ է տրել պատվաստը:
- **Պահանջեցեք** ձեր բժիշկից, բոլժբոլջից կամ առողջա-պահական բաժնից Vaccine Adverse Event Reporting System-ի (VAERS) ձև լրացնել կամ թէ դուք ինքներդ հեռաձայնեք **1-800-822-7967**, կամ այցելեցեք **ծրագրի Website-ը** հետևեալ հասցեով <http://www.vaers.org>. **VAERS – ը չի մատակարարում ոչ մի բժշկական խորհուրդ:**

8 Ինչպէս կարող եմ իմանալ ավելին ?

- Զարցրեք ձեր բժիշկին կամ բոլժբոլջը: նրանք ձեզ կտան պատվաստների մասին տեղեկատւական գրքոյկի ներդիր, կամ կառաջարկեն տեղեկութեան այլ աղբիւրներ:
- Հեռաձայնեցեք ձեր շրջանային կամ նահանգային բաժնի ախտազերծման ծրագրին:
- Կապւեցեք, Center for Disease Control & Prevention (CDC)-ի հետ:
 - Հեռաձայնեցեք **1-800-232-2522** (Անգլերեն)
 - Հեռաձայնեցեք **1-800-232-0233** (Սպաներեն)
 - Այցելեցեք CDC-ի website-ը www.cdc.gov/flu



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Inactivated Influenza Vaccine - Armenian 5/24/04
Translation provided by Los Angeles County Health Department