

El Rohipnol y el GHB

El Rohipnol y el GHB son predominantemente depresores del sistema nervioso central. Ya que generalmente no tienen color, sabor ni olor, se pueden añadir a las bebidas y ser ingeridos sin que se detecten.

Estas sustancias surgieron hace pocos años como las drogas "para cometer asaltos sexuales."* Debido a la preocupación por su abuso, en octubre de 1996, el Congreso aprobó la "Ley de 1996 para la Prevención y Penalización de las Violaciones Inducidas por Drogas" ("Drug-Induced Rape Prevention and Punishment Act of 1996"). Esta ley aumentó las sanciones federales por el uso de cualquier sustancia controlada para ayudar en la ejecución de un asalto sexual.

El Rohipnol —————

El Rohipnol, (nombre comercial del flunitracepam) pertenece a una clase de drogas conocidas como benzodiazepinas. El Rohipnol puede incapacitar a sus víctimas e imposibilitarlas para resistir la agresión sexual. Puede producir una "amnesia anterógrada," lo que significa que es posible que las personas no

recuerden lo que les ocurrió cuando estaban bajo los efectos de la droga. El Rohipnol también puede ser letal cuando se mezcla con alcohol u otros depresivos.

El Rohipnol no está aprobado para uso en los Estados Unidos y su importación está prohibida. El uso ilícito del Rohipnol empezó en los Estados Unidos a principios de los años 90, cuando se comenzó a conocerse como "rophies," "roofies," "roach," y "rope."

El abuso de otras dos drogas parecidas parece haber reemplazado el abuso del Rohipnol en algunas partes del país. Estas son el clonacepam, vendido en los Estados Unidos como Klonopin y en México como Rivotril, y el alprazolam, vendido como Xanax. Sin embargo, el Rohipnol sigue siendo un problema entre los ingresados a tratamiento en el área fronteriza de Texas con México.

El GHB —————

Desde aproximadamente 1990, en los Estados Unidos se ha abusado del GHB (gammahidroxitirato) por sus efectos eufóricos, sedativos y anabólicos (físico-culturismo). Es un depresor del sistema

nervioso central que estuvo ampliamente disponible sin necesidad de receta médica en las tiendas naturistas durante los años 80 hasta 1992. En su mayoría lo compraban los fisicoculturistas como ayuda para reducir la grasa y aumentar la musculatura. Sus nombres de la calle incluyen "liquid ecstasy," "soap," "easy lay," "vita-G," y "Georgia home boy."

Pueden producirse coma y convulsiones después de haber abusado del GHB. Cuando se usa mezclada con otras drogas como el alcohol, puede producir náuseas y dificultad para respirar. El GHB también puede producir efectos del síndrome de abstinencia, incluyendo insomnio, ansiedad, temblores y sudoración. El GHB y dos de sus precursores, el gama butirrolactona (GBL) y el 1,4 butenodiol (BD), han sido implicados en envenenamientos, sobredosis, violaciones en las citas y muertes.

Alcance del Uso ———

De acuerdo al Estudio de Observación del Futuro del 2003 (MTF, por sus siglas en inglés), la encuesta nacional auspiciada anualmente por el NIDA sobre el uso de drogas entre los estudiantes de la secundaria en todo el país, el 0.5 por ciento de los estudiantes del 8° grado, el

0.6 por ciento de los estudiantes del 10° grado, y el 1.3 por ciento de los estudiantes del 12° grado informaron uso anual ** del Rohipnol.***

El uso del GHB por estudiantes de la secundaria en el año anterior se mantuvo relativamente estable entre el 2002 y el 2003, de acuerdo a los hallazgos del MTF. En el 2003, el 0.9 por ciento de los estudiantes del 8° grado, el 1.4 por ciento de los estudiantes del 10° grado, y el 1.4 por ciento de los estudiantes del 12° grado informaron uso anual.*** Los episodios de visitas a las salas de emergencia de los hospitales (ED, por sus siglas en inglés) que involucraban al GHB aumentaron de 56 en 1994 a 4,969 en el 2000, y después disminuyeron a 3,330 en el 2002. Entre las menciones de ED que involucraban drogas de club, sin embargo, solamente la MDMA (éxtasis) se menciona con más frecuencia que el GHB.****

Otros Servicios de Información ———

Para información adicional sobre el Rohipnol y el GHB, por favor también vea el *InfoFacts* del NIDA sobre Drogas de Club y visite www.clubdrugs.org.

* También conocido como la “droga para la violación en cita,” “droga para violación,” y “droga para las violaciones por conocidos.”

** “Por vida” se refiere al uso de por lo menos una vez en la vida del respondiente. “Anual” se refiere al uso por lo menos una vez en el año anterior al que la persona participa en la encuesta. “30 días” se refiere al uso por lo menos una vez en los 30 días anteriores al que la persona contesta a la encuesta.

*** Estos datos son del Estudio de Observación del Futuro del 2003, financiado por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, Institutos Nacionales de la Salud, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el cual lo realiza anualmente el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. La encuesta ha seguido el uso de drogas ilícitas y actitudes relacionadas de estudiantes del 12° grado desde 1975; en el 1991, se añadieron a los estudiantes del 8° y del 10° grado al estudio. Los últimos datos están en línea en el www.drugabuse.gov.

**** Los datos de las visitas a las salas de emergencia provienen de la Red Anual de Alerta sobre el Abuso de Drogas, financiada por la Administración de Servicios de Abuso de Drogas y Salud Mental (SAMHSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. La encuesta proporciona información sobre las visitas a las salas de emergencia que son inducidas o relacionadas con el uso de drogas ilícitas o con el uso no médico de una droga legal. Los datos anuales más recientes están disponibles llamando al 1-800-729-6686 o en línea visitando www.samhsa.gov.

NIDA NATIONAL INSTITUTE
ON DRUG ABUSE **30** Years
1974-2004

En Español

**Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los
Estados Unidos—Institutos Nacionales de la Salud**

Este material se puede usar o reproducir sin necesidad de pedir permiso al NIDA.
Se agradece citar la fuente.