

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, បាញ់បញ្ចូលតាមច្រមុះបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ

អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងនោះ

ឆ្នាំ 2004-2005

4 តើអ្នកណាមិនត្រូវប្រើថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, ច្របាច់ បាញ់បញ្ចូលតាមច្រមុះបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ?

1 ហេតុអ្វីបានត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍ការពាររោគ ?

រោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ("គ្រុនផ្តាសាយ") គឺជាមេរោគធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ រោគនេះកើតឡើងដោយសារមេរោគដែលរាលដាលពីមនុស្សមានរោគធ្ងន់ជាង ច្រមុះ ឬបំពង់កពីអ្នកដទៃ។ រោគគ្រុនផ្តាសាយធំអាចធ្វើអោយ :

- គ្រុនក្តៅ
- ឈឺបំពង់ក
- គ្រុនញាក់
- ក្អក
- ឈឺក្បាល
- លិសាច់ដុំ

អ្នកណាក៏អាចមានកើតរោគគ្រុនផ្តាសាយធំនេះដែរ។ មនុស្សភាគច្រើនមានជម្ងឺ លិចតាចដោយសាររោគគ្រុនផ្តាសាយធំតែពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ តែមានអ្នកខ្លះបានលើខ្លាំង លើសអោយទៅដេកពេញផង។ រោគគ្រុនផ្តាសាយធំធ្វើអោយមានមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ 36,000 នាក់រាល់ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ភាគច្រើនគឺមនុស្ស ចាស់ៗតែម្នាក់។

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍ចាក់បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ

2 ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, បាញ់បញ្ចូលតាមច្រមុះបង្ការរោគ គ្រុនផ្តាសាយធំ

មានប្រភេទថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍ពីរប្រភេទអាចប្រើប្រាស់បានឥឡូវនេះ។ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍សម្រាប់សកម្មភាពរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ និងថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍។ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, បាញ់បញ្ចូលតាមច្រមុះ (មានឈ្មោះថា FluMist™) មាន ឧបសគ្គ ពេញច្បាប់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ 2003 ។ ថ្នាំ FluMist មានជាតិថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, កាត់បន្ថយ (ធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយ) ដល់មេរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ។ ថ្នាំនេះប្រើ ដោយច្របាច់បាញ់បញ្ចូល តាមរន្ធច្រមុះ មិនមែនចាញ់តាម សាច់ដុំនោះឡើយ។ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍សម្រាប់សកម្មភាពរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ជូនកាលគេហៅថា "ថ្នាំចាក់បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ" ថ្នាំនេះគេបានប្រើ ប្រាស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយ គឺជាថ្នាំចាក់។ ថ្នាំនេះទប់ស្កាត់មេរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ។

3 តើអ្នកណាអាចចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, ច្របាច់បាញ់ បញ្ចូលតាមរន្ធច្រមុះបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំបាន ?

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, ច្របាច់បាញ់តាមរន្ធច្រមុះ គឺមានការអនុញ្ញាតសំរាប់ចាក់ឲ្យពេញ មានសុខភាពមាំមួន និងមនុស្សពេញវ័យ មានសុខភាពមាំមួន ដែលមានអាយុចាប់ពី 5 ឆ្នាំ ដល់ 49 ឆ្នាំ, រួមទាំងការចាក់ទង់ប៉ះពាល់មនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលទំនង មានកើតរោគគ្រុនផ្តាសាយធំនេះខ្ពស់។ ក៏ប៉ុន្តែ ថ្នាំ FluMist មិនត្រូវប្រើប្រាស់ដោយ មនុស្សដែលមានលក្ខណៈសុខភាពមិន ល្អ, ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ឬមនុស្សដែលទំនង មានកើតរោគគ្រុន ផ្តាសាយធំខ្ពស់ (ចូរមើលផ្នែកទី 4)។

- ដូចជាមនុស្សមាននៅនេះ មិនគួរប្រើថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍ច្របាច់បាញ់បញ្ចូលរន្ធច្រមុះ បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំឡើយ។ មនុស្សប្រភេទនេះ គួរសាកសួរអ្នក ផ្តល់ការព្យាបាលសុខភាពអំពីការ ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍សម្រាប់សកម្មភាពមេរោគគ្រុនផ្តាសាយធំជាមុនសិន។
- មនុស្សដែលមានអាយុ 50 ឡើងទៅ, ឬ ក្មេងក្រោមអាយុ 5 ឆ្នាំ។
 - មនុស្សដែលមានបញ្ហាសុខភាពយូរអង្វែងជាមួយនិងរោគ :
 - រោគយះផ្លូវ
 - រោគក្រលៀន (កម្រងនោម)
 - រោគស្បែក
 - រោគញាញុបកាយ ដូចរោគទឹកនោមផ្អែម
 - រោគហឺត
 - រោគខ្វះឈាមក្រហម និងរោគពេលវេជ្ជផ្សេងៗ
 - មនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធភោសិកខ្សោយដោយមានរោគ :
 - រោគអាយវី/អេដស៍ (HIV/AIDS) ឬក៏រោគផ្សេងៗដែល ប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធភោសិក
 - ការព្យាបាលរោគយូរអង្វែងជាមួយថ្នាំពេទ្យ ដូចជាថ្នាំ ស្ទ្រីមីយ
 - ការព្យាបាលមហារីកដោយ អ៊ីច-ដី ឬ ថ្នាំពេទ្យ
 - ក្មេង ឬមនុស្សពេញវ័យប្រើប្រាស់ថ្នាំអាស៊ីនេស៍ព្យាបាល រោគយូរអង្វែង (មនុស្សប្រភេទនេះអាចកើតមានរោគការ៉េរោគ រីយេ (Reye Syndrome) បើសិនពួកគេកើតមានរោគគ្រុនផ្តា សាយធំ)។
 - ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ។
 - មនុស្សណាដែលមានប្រវត្តិរោគរោគ Guillain-Barré-Syndrome (GBS) ។

ថ្នាំចាក់បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ (ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍សម្រាប់សកម្មភាពរោគ) ប្រើប្រាស់ជាថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍, ច្របាច់បាញ់បញ្ចូលតាម ច្រមុះសំរាប់ដេដូបណ្តើត, គ្រូពេទ្យ, សមាជិកក្រុមគ្រួសារ, ឬ ក៏អ្នកណាដែលមានការចាក់ទង់ប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សដែល មានប្រព័ន្ធភោសិកទន់ខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរនោះ (ឧទាហរណ៍ ការព្រមព្រៀងមានការព្យាបាល ក្នុងបរិប្បទានគ្រប់គ្រងណាមួយ)។

មនុស្សដូចមាននៅនេះ គួរសាកសួរអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានមុននឹងចាក់ថ្នាំ វ៉ាក់ស៊ីនេស៍បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំណាមួយ :

- មនុស្សដែលធ្លាប់មានរោគរោគចាស់ធ្ងន់ធ្ងរពីពេល ឬពីថ្នាំ វ៉ាក់ស៊ីនេស៍បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំពីមុនមក។
- បើសិនជាលោកអ្នកមានគ្រុន ឬជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលណា ចាក់ថ្នាំលោកអ្នក គួររង់ចាំរាល់ស្បែកស្រពិលស្រពិល មុននឹងចាក់ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនេស៍បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំនេះ។ ពិភាក្សាជាមួយ ដេដូបណ្តើត ឬគ្រូពេទ្យ តើគួរដាក់ពេលណាដំបូងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ ស៊ីនេស៍បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំឬអត់។

5 តើពេលណាគួរឱ្យខ្ញុំចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ?

ពេលល្អបំផុតសំរាប់ចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ គឺ នៅក្នុងខែតុលា ឬខែវិច្ឆិកា។ រដូវមានរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ចាក់ផ្តើមពីខែតុលាដល់ខែមីនា, ក៏ប៉ុន្តែ ភាគច្រើនរោគកើតខ្លាំងនៅខែកុម្ភៈ។ ដូច្នេះការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីននៅខែតុលា ឬក៏ពេលព្រមនេះ នេះ អាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ការពារបានជាច្រើនផ្ទុំ។

បន្ទុករោគច្រើនត្រូវការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ តែម្តងក្នុងមួយឆ្នាំ ដើម្បីការពាររោគគ្រុនផ្តាសាយធំ។ ក៏ប៉ុន្តែ ចំពោះក្មេងមានអាយុក្រោម ១ ឆ្នាំ បានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនជាលើក ៨ ដំបូង គួរចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីននេះពីរដំបូង។ ចំពោះថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់ សំរាប់បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ត្រូវប្រើក្នុងរយៈពេលរវាង 6-10 អាទិត្យដាច់ពីគ្នា។ ក្មេងទាំងអស់នេះ គួរចាក់ថ្នាំនៅលើកដំបូងក្នុងខែតុលា ឬមុនខែនេះ។ ក្មេងក្នុងវ័យនេះ ដែលបានចាក់ថ្នាំមួយដំបូងមុនមក ទោះបីពួកគេចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនជាលើកដំបូងក៏ដោយ ពួកគេត្រូវការចាក់ថ្នាំមួយដំបូងប៉ុណ្ណោះ នៅឆ្នាំនោះ។

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់, ត្រូវចាក់ប្រហែលជាមួយមធ្យមបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំប្រហែលជាអាចប្រើប្រាស់នៅពេលចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីន ផ្សេងៗទៀតដែរ។ នេះរួមទាំងថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់ផ្សេងទៀត ដូច ជាថ្នាំចាក់បង្ការរោគគ្រុនឡូខែន, រោគកញ្ជ្រៀម, រោគស្លាត, ឬ រោគអុតតូច។ ក៏ប៉ុន្តែ បើថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់ពីរមិនបានចាក់ឱ្យស្មើ ពេលគ្នាទេ ថ្នាំនេះត្រូវចាក់ឱ្យយ៉ាងតិច 4 អាទិត្យសុទ្ធពេលពីគ្នា។

មេរោគគ្រុនផ្តាសាយធំផ្តាសាយធំជាញឹកញាប់។ ដូច្នេះហើយ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ ត្រូវដៃតែតម្រូវជាប្រយោជន៍ ហើយតម្រូវឱ្យមានការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបង្ការរោគប្រចាំឆ្នាំ។

6 តើមានភាពអន្តរាយពីថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់, បាញ់តាមប្រមូលបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំយ៉ាងណាដែរ ?

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីន ក៏ដូចថ្នាំផ្សេងៗទៀតដែរ គឺអាចធ្វើឱ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត ដូចជាប្រតិកម្មចាស់និង អ្វីមួយផ្សេងៗ។ ភាពចំនង់ធ្ងន់ឱ្យមានភាពអន្តរាយដោយថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនផ្តល់ ឬក៏ស្លាប់នោះ គឺ មានចំនួនទាបណាស់។

ភាពចំនង់មេរោគថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់បង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំអាចរារាំងដល់អនុស្ស ម្នាក់ទៀតបាន គឺមានតិចតួចណាស់។ ទោះបីមានការរីករាលដាលនោះ វាប្រហែលជាមិនអាចធ្វើឱ្យមានជំងឺឡើយ។

ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនរស់, ត្រូវចាក់ប្រហែលជាមួយមធ្យមបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ អាចធ្វើឱ្យមានការរោគអម្បត់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ (ត្រូវមើលខាងក្រោម)។

បញ្ហាមធ្យម :

មានក្មេងខ្លះ និងមនុស្សពេញវ័យមានអាយុពី 5-17 ឆ្នាំ មានសេចក្តីភ័យ ការណ៍ពីប្រតិកម្មចាស់មធ្យម ដែលរួមមាន :

- ពេក្រវល់បោក, តឹងត្រមុះ ឬក្អក
- គ្រុន
- ឈឺក្បាល និងឈឺសាច់ដុំ
- ឈឺចុកជ្រោះ ឬក្អកក្អាយ ឬចុះភាគ

មានមនុស្សពេញវ័យខ្លះពីអាយុ 18-49 ឆ្នាំមានសេចក្តីភ័យការណ៍មានបញ្ហា :

- យក្រវល់បោក ឬ តឹងត្រមុះ
- ក្អក, គ្រុនក្អក, អស់កម្លាំង/ទន់ខ្សោយ
- ឈឺចុកជ្រោះ
- ឈឺក្បាល

ភាពរោគនេះមិនមានសកម្មភាពយូរទេ វាជាបញ្ហាទៅវិញវិញ។ ទោះសកម្មភាពនេះមានកើតឡើងព្រមទាំងថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនក៏ដោយ, បញ្ហានេះប្រហែលជាមិនមែនមកពីការចាក់ ថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីននោះទេ។

- បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ :**
- ប្រតិកម្មចាស់ដល់អាយុជីវិត គឺកម្រមានណាស់។ បើសិន ជាមាន វាកើតឡើងក្នុងពេលពីរម៉ោង ឬពីរថ្ងៃដំបូងប្រាកដ ពីបានចាក់ថ្នាំហើយ។
 - បើសិនជាមានប្រតិកម្មកម្រមាននេះកើតឡើងដោយសារការ ប្រើប្រាស់ថ្នាំមធ្យមបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ បញ្ហានេះប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបាន បាន របៀបដល់មានមនុស្សប្រើប្រាស់រាប់ពាន់ ឬលាននាក់បាន ប្រើប្រាស់ថ្នាំមធ្យមបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ។ ដូចថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនទាំងអស់ដែរ, ថ្នាំ វ៉ាក់ស៊ីនរស់, ត្រូវចាក់ប្រហែលជាមួយមធ្យមបង្ការរោគគ្រុនផ្តាសាយធំ គឺមានការពិនិត្យ មើលចំពោះបញ្ហាអ្វីមួយ ឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តណាមួយជាទីក្នុង។

7 ត្រូវធ្វើយ៉ាងណា បើមានប្រតិកម្មមធ្យម ឬ ធ្ងន់ ធ្ងរនោះ ?

តើអោយខ្ញុំពិនិត្យមើលអ្វី ?

- មានលក្ខណៈចំណុះ ដូចជាគ្រុនក្រហម ឬមានអាការ្យក្រហមប្រហែល មាន សញ្ញាប្រតិកម្មចាស់ធ្ងន់ធ្ងរអាចរួមមានការ ពិបាកដកដង្ហើម, សម្លេងស្លាក ឬ សម្លេងគូតស្រោបៗ, កន្ទួល រកាស់, ស្លេកស្លាំង, ទាន់ខ្សោយ, ឈាមដើរលឿន ឬ វិល មុខ។

តើខ្ញុំត្រូវយ៉ាងណា ?


- ទូរស័ព្ទទៅវេជ្ជបណ្ឌិត, ឬក៏អនុស្សទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតភ្លាម។
- ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតប្រហែលជាតើឡើង, ខែត្រូវ និងពេលវេលា ប្រហែលជាតើឡើង ហើយនិងពេលវេលាថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីនបានចាក់។
- សួរវេជ្ជបណ្ឌិត, គ្រូពេទ្យ ឬ មន្ទីរសុខភាពធ្វើរបាយការណ៍ពី ប្រតិកម្មដោយប្រើប្រាស់ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ។

ឬ លោកអ្នកអាចដាក់របាយការណ៍តាមគេហទំព័រកុំព្យូទ័ររបស់ VAERS អាសយដ្ឋាន www.vaers.org ឬទូរស័ព្ទមកលេខ 1-800-822-7967 ។

ភ្នាក់ងារ VAERS មិនផ្តល់នូវវិធានការព្យាបាលសុខភាពទេ។

8 តើឱ្យខ្ញុំយល់ដឹងពីរឿងនេះថែមរបៀបណា ?

- សាកសួរអ្នកផ្តល់ការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគរបស់លោកអ្នក។ ពួកគេអាចផ្តល់ឱ្យលោក អ្នកនូវការព្យាបាលថ្នាំវ៉ាក់ស៊ីន ឬផ្តល់ប្រាប់ពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗ។
- ទូរស័ព្ទមន្ទីរសុខភាពក្នុងតំបន់ ឬគ្រូស្តង់សុខភាពអ្នក។
- ចាក់ទង់មកមជ្ឈមណ្ឌល Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 - ទូរស័ព្ទ 1-800-232-2522 (អាណាអង់គ្លេស)
 - មើលគេហទំព័រ ជំនួស អាសយដ្ឋាន www.cdc.gov/ncidod/diseases/flu/fluovirus.htm ឬ www.cdc.gov/nip



Vaccine Information Statement
 Live, Intranasal Influenza Vaccine IMM-778 CA - Cambodian (5/24/04)
 Translated by Transcend, Davis, CA
www.transcend.net