

Cirugía Correctiva de la Mandíbula



E

l crecimiento de las quijadas es un proceso lento y gradual. Algo puede ir mal en este proceso y las mandíbulas superior e inferior pueden crecer en proporciones distintas.

EL CRECIMIENTO DESIGUAL DE LAS MANDÍBULAS PUEDE CAUSAR MUCHOS PROBLEMAS

Una o ambas mandíbulas pueden crecer demasiado o poco. La anomalía que resulta puede



interferir con el alineamiento adecuado de los dientes, el habla y la masticación. La lengua y los labios pueden ser forzados a moverse inconvenientemente al hablar y al tragar para compensar la mala relación de las mandíbulas. Puede que exista un defecto en el habla, o respiración por la boca.

El modo inapropiado de morder puede amenazar a largo plazo la salud de las encías y de los dientes. La articulación de la mandíbula (ATM) también puede ser afectada desfavorablemente por la mala relación de las mandíbulas. Sin mencionar el hecho de que las mandíbulas de tamaños distintos—que no corresponden—pueden afectar la apariencia.

TRATAMIENTO

Cuando el crecimiento desigual es la fuente del problema, puede ser necesaria la cirugía correctiva de la mandíbula. Puede que también se necesiten los ortodónticos “braces” para

permitir que los dientes encajen adecuadamente. La cirugía correctiva de la mandíbula implica mover toda o parte de la mandíbula superior y/o inferior a una posición más favorable. Por ejemplo, la mandíbula completa puede moverse hacia atrás si ésta es demasiado grande. El propósito del tratamiento es mejorar la función y restaurar el balance facial.

Además, algunas personas tienen anomalías faciales que están relacionadas sólo con la parte superior del rostro, los pómulos y la nariz. Estos también pueden corregirse. Los huesos son puestos nuevamente en posición a fin de que los rasgos faciales sean más simétricos. Usualmente, esto es acompañado por la devolución de la respiración normal, patrones al hablar y al comer.

Después que las mandíbulas son movidas a su nueva posición, pueden utilizarse cintas de hule o alambres sujetos a los dientes para fijar juntas las mandíbulas durante el sanad^o como alternativa puede ser utilizada la fijación interna rígida con tornillos diminutos y placas esto permite que si pueda abrir y cerrar las mandíbulas rápidamente después de la cirugía correctiva.

VEA CON MAS ATENCION

Vea con más atención su forma de morder y su apariencia. ¿Sobresale su barbilla? ¿Está muy atrás? ¿Ajustan apropiadamente sus dientes? ¿Tiene dientes sobre salientes? ¿Están derechos sus dientes?

Si usted sospecha que existe una causa de preocupación, deje que su cirujano oral y maxilofacial examine su rostro y su forma de morder. ●



**Asociación Americana de
Cirujanos Orales y Maxilofaciales**

9700 W. Bryn Mawr Avenue
Rosemont, Illinois 60018-5701
847/678-6200 Fax: 847/678-6286
Website: www.aaoms.org

©2000 Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales
All rights reserved. Printed in the United States of America.
PS4 (3M/3.00)